



葉面散布・土壌施用共用

リグニンでキレートした総合微量元素植物活性剤

マルチケーミン



酵素活性増進

光合成促進

収穫・品質アップ

生育促進

健全育成

日持ち向上

病害抵抗性増強

根圏環境改善
・根張りの拡充

微量元素補給
・肥効改善

茎を堅固にし葉緑を増す(徒長防止・充実生育)

(毒性はございませんが、お子様の手の届かない場所に保管し、誤飲しないようにして下さい。)

マルチケーミン	鉄	マンガン	ほう素	亜鉛	銅	モリブデン	イオウ
リキッド含有量(%)	1.27	0.38	0.25	0.41	0.13	0.03	1.91
ドライS含有量(%)	4.00	1.20	0.80	1.30	0.40	0.10	6.00

アイアンケーミン(姉妹品)	鉄	イオウ
リキッド含有量(%)	3.38	3.38
ドライS含有量(%)	11.0	11.0

入目・荷姿
6L×2本 BIB ドライS
10L・20L BIB 2.5kg×8袋/ケース

入目・荷姿
1Lポリ缶×12本
6L×2本 BIB
10L・20L BIB
ドライS
2.5kg×8袋/ケース

【販売店】

【製造元】




ラサ晃栄株式会社



葉面散布・土壌施用共用

マルチケーミン

葉菜・果菜・根菜・果樹・花卉・芝・家庭園芸用
リグニンでキレートした総合微量元素(植物活性化剤)



◇《このような時期にお使いください》

・健全生育のために定期的に使用します。

- 植物を健全に生育させたい …… 葉面散布、1000～1500倍、7～10日に1回。
- 葉や花の色を彩かにしたい …… 葉面散布、1000倍、7日に1回。
- 根張りを促進充実させたい …… 土壌へ200～400倍(0.5～1ℓ/㎡)で灌注。定植前に1回と10～15日に1～2回。
- 健苗づくり …… 葉面散布、1500～2000倍、5～7日に1回、2～3回かける。

・土壌・苗床・本圃栽培の重要なポイントで使用します。

- 土づくり・ポット培土に …… 作土にすき込み、グラニュー剤、5～10kg/10a。
- 播種床・仮植床・定植床に …… 床土に散布、液剤、200～400倍、2ℓ/10a。
- 鉢上げ・育苗中に …… 液剤を灌水で、本葉2枚以降、2000倍で7～10日毎。
- 定植後に …… 液剤を灌水で、定植の5～7日後、3000倍。
- 本圃栽培期間中 …… 液剤を灌水に混和、100～300ml/10a、4回/月。

・障害の緩和・治療にすかさず施用。

- 生育が悪く、草丈の伸びが悪い …… 葉面散布、1000倍、週に1～2回。
- 植物が萎れたり、元気がない …… 葉面散布、1000倍、週に1～2回。
- 葉が黄色(異常状態)になった …… 葉面散布、1000倍、症状が治まるまで週2～3回散布。
- 芝の黄化症には …… 葉面散布、400倍、症状が治まるまで適時散布。

【注意点】①他の剤との原液混合はしないようにお願い致します。

②1000倍以下の希釈倍率で散布すると、花や葉がケーミンで着色する場合があります。

収穫14日前以降は、2000～3000倍の希釈で施用してください。

【販売店】

【製造元】



ラサ晃栄株式会社