

生育調整用肥料 ポイントS

花芽分化促進・徒長抑制



生殖成長
促進

製造元：ラサ晃栄株式会社

生育調整用(粉末)液肥

ポイントS

0—40—26

成分

5 kg × 4 袋ダンボールケース入り

保証成分 (%)				有効成分 (%)	
水溶性 りん酸	水溶性 加里	水溶性 苦土	水溶性 ほう素	亜鉛	モリブデン
40.0	26.0	5.0	0.05	0.12	0.054

特徴

- ①りん酸、加里を主成分とする、生育調整用の無窒素肥料です。
- ②花芽分化の促進・花芽の充実に効果を発揮します。
- ③窒素の片効きによる様々な障害に効果を発揮します。



ツルボケ・徒長、異常落花、茎葉の軟弱化、花芽分化の遅れ等

- ④農薬との混用が可能です。

使用方法

各作物の適用濃度に希釈し、灌水又は葉面散布でご使用ください。


使用濃度のだいたいの目安は下の表の通りです。

作物	使用時期	使用方法	希釈倍率	10a 当たり使用量	回数
いちご	苗床(仮鉢・ポット)	散水施肥	500倍	3 ~ 5 kg	1 ~ 2
	株づかれ時	(灌水)	700倍	5 kg	//
ハウスマカン	花芽形成期	灌水施肥	700倍	5 ~ 10kg	2 ~ 3
メロン	ツルボケ・徒長時	葉面散布	500倍	散布液量に応じて	//
ぶどう	開花前	//	800倍	//	//
うり類	ツルボケ・徒長時	灌水施肥	500倍	5 kg	//
ピーマン	収穫最盛期	//	500倍	//	3 ~ 4
甘藷	根部肥大初期	葉面散布	300~500倍	散布液量に応じて	//
パレイショ	開花初期	//	300~500倍	//	//

いちご(女峰)での使用例

(8月未定植)

施 用 区



8月上旬500倍液
3.3㎡当り10ℓ 灌注

2番果以降の花芽もよく発育。



定植後500倍液灌注2回
葉面散布3回

果梗が太く、短い。
2、3番果も大玉になる。

無 施 用 区



1番果のみ発育



果梗が徒長ぎみ。
収穫がおくれ、大玉はオニ果のみ。

使用上の注意

- ①高温時の葉面散布は避けて下さい。
- ②農薬混用時は規定の倍率より2～3割薄くして下さい。
- ③強アルカリ性農薬との混用は避けて下さい。特に石灰硫黄合剤との混用は有毒ガスが発生する恐れが有り危険ですので混用はしないで下さい。

製造元

ラサ晃栄株式会社

本社	〒101-0047	東京都千代田区内神田二丁目6番8号 TEL:03-3256-8211(代)
草加工場	〒340-0017	埼玉県草加市吉町四丁目4番48号 TEL:0489-28-7331(代)
大阪営業部	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地二丁目3番3号 TEL:06-6341-7201(代)

特約店