

スタートダッシュ



りん酸コリン+スピルリナ抽出成分の
相乗効果でグレードアップ



NET:1ℓ

発根促進

根量増大

早期活着

出穂促進

成分

りん酸コリン・スピルリナ抽出物・キトサン酵素分解物・有機酸（クエン酸・酢酸）・その他肥料成分

保証成分量 (%)

窒素全量	2.0
内アンモニア性窒素	1.2
水溶性りん酸	6.0

ラサ晃栄株式会社

東京営業課

東京都千代田区内神田二丁目6番8号

TEL.03-3256-8211

大阪営業課

大阪市北区曽根崎新地二丁目3番3号

TEL.06-6341-7201

■ 特長

「スタートダッシュ」は、りん酸コリンとスピルリナ抽出物及びキトサン酵素分解物等々を配合した根部生育専用液肥です。

育苗期においては根量の増大と発根を促し、本圃定植後においては それ以外に早期活着と生育の促進等々にも効果を発揮いたします。

「**りん酸コリン**」とは、りん酸とコリンとの化合物です。コリンは、ビタミンBの一種で植物への吸収移行性に優れ光合成の促進や発根の促進に参与しています。又りん酸の吸収も早く、吸収されたりん酸の移動が速やかなのが特徴です。

「**スピルリナ**」とは、地球上に出現した最古の植物で微細なラセン形をした藍藻類の一種です。スピルリナは、健康食品・天然食用色素として利用されビタミン・ミネラルアミノ酸等々を豊富に含んでいます。

液肥として使用すると植物に効率良く吸収され植物の生育(特に根部)を促進致します。

■ 使用方法 (育苗期使用)

発芽後、本葉第1葉～1.5葉展開期頃から定植直前まで数回500倍～1,000倍で灌水及び定植前のドブ漬け。

(本圃使用)

定植直後から生育前期にかけて、灌水時に数回流し込み。

目安として本品(1ℓ)を10a当たり1～2本(1,000倍～2,000倍になる様に)投入して下さい。

収穫開始期からは、灌水だけでなく葉面散布(500倍～1,000倍)でもご使用出来ます。

■ 使用濃度

500～1,000倍

※上記の育苗期使用と本圃使用との併用処理が最も理想的ですが、使用目的に応じてどちらかの単用処理も有効です。

■ 使用上の注意

他の液肥や農薬(一部を除く)の混用はできますが、念のため事前に極小面積で害の無いことを確認してから全面に使用して下さい。

重金属入り農薬及びアルカリ性農薬との混用はしないで下さい。

石灰硫黄合剤との混用は、有害な硫化水素ガスが発生する恐れがあり危険ですから混用しないで下さい。

高温時での葉面散布は避けて下さい。

取扱店